

التهاب الكبد C

الأشخاص الذين يحتاجون إجراء الفحص الأولي للكشف عن فيروس الكبد C:

- الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويتشاركون الإبر.
- الأشخاص الذين لديهم أوشام أو ثقوب في الجلد.
- من تمت لهم عمليات نقل دم ملوث.
- الأطفال المولودون لأمهات مصابات بالتهاب الكبد C.
- نزلاء السجون.
- المصابون بفيروس العوز المناعي البشري.
- المتزوجون بشريك مصاب بفيروس الكبد C.

علاج فيروس التهاب الكبد C:

يوجد علاج لفيروس الكبد C وهو فعال بنسبة تصل إلى ٩٥٪ في المئة لذلك من المهم التشخيص المبكر حتى يتم اعطاء المريض الدواء.

الوقاية من فيروس الكبد C:


- لا يوجد في الوقت الراهن لقاح فعال مضاد لفيروس الكبد C لذلك ينصح بالوقاية عن طريق:
- الاستخدام الآمن والنظيف لمعدات الحقن.
- فحص الدم المتبرع به.
- الابتعاد عن الممارسات الجنسية الخطرة والتي تؤدي للتعرض إلى الدم.
- توعية الطاقم الصحي بالإستخدام السليم للإبر والأدوات الحادة.
- رفع الوعي لدى العموم عن فيروس التهاب الكبد C.
- الكشف المبكر عن المصابين بالفيروس وعلاجهم.
- تطعيم المصابين بفيروس الكبد C ضد فيروسات الكبد الأخرى (كفيروس A و B).

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

عضو في مؤسسة حمد الطبية
A Member of Hamad Medical Corporation



اعراض التهاب الكبد C



خطورة الإصابة بالتهاب الكبد C:

قد يؤدي إلى:

- تليف الكبد ومرض الكبد المزمن.
- سرطان الكبد.

كيفية تشخيص التهاب الكبد C:

يتم تشخيص وتقييم المرض عن طريق عدة خطوات:

- أولاً: يتم اختبار وجود الأجسام المضادة لفيروس الكبد C عن طريق إجراء اختبار مصلي على دم المريض.
- ثانياً: إذا كانت نتيجة الاختبار المصلي إيجابية، يتم اختبار وجود الحمض النووي في دم المريض لتأكيد العدوى المزمنة.
- ثالثاً: إذا تم تأكيد العدوى المزمنة يتم تقييم مدى تضرر الكبد نتيجة الالتهاب عن طريق الموجات الصوتية أو أخذ عينات من الكبد إذا لزم الأمر.

هو التهاب كبدي ناتج عن الإصابة بفيروس الكبد C مما ينتج عنه قصور حاد أو مزمن في وظائف الكبد تتراوح حدته ما بين المرض الخفيف الذي يستمر لأسابيع قليلة وما بين المرض الخطير الذي قد يستمر طيلة الحياة.

كيفية الإصابة بفيروس التهاب الكبد C:

ينتقل فيروس الكبد C عن طريق الدم. لذلك قد تحدث الإصابة بالفيروس عن طريق:

- تعاطي المخدرات بالوريد ومشاركة الحقن الملوثة.
- نقل الدم الملوث من شخص لآخر.
- بنسبة ضئيلة قد ينتقل الفيروس من الأم الحامل إلى الجنين.

ملاحظة: لا ينتقل فيروس الكبد C عن طريق:

- حليب الأم.
- الأكل والماء.
- مجالسة الشخص الحامل للفيروس.

أعراض الإصابة بفيروس الكبد C:

تتراوح فترة حضانة فيروس الكبد C من أسبوعين إلى ستة أشهر. معظم المرضى لا تبدو عليهم أعراض مرضية عند الإصابة بالفيروس إلا أن بعض المرضى قد يشعرون بالآتي:

- حمى.
- إرهاق.
- فقدان الشهية.
- غثيان.
- تغير في لون البول أو البراز.
- آلام المفاصل.
- اصفرار لون الجلد والعيون.