

التهاب الدماغ الياباني



للمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال على :

مركز الأمراض الإنتقالية

مؤسسة حمد الطبية

CDCtravel@hamad.qa @

٤٠٢٥٤٠٠٣ ☎

تمت الموافقة عليه من قبل:

تثقيف المرضى وأسرههم

patienteducation@hamad.qa @

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

عضو في مؤسسة حمد الطبية
A Member of Hamad Medical Corporation



مقدمة

- التهاب الدماغ الياباني هو مرض فيروسي.
- ينتقل عن طريق البعوض.
- يستوطن المرض في حوالي ٢٤ دولة من دول جنوب شرق آسيا، شبه القارة الهندية، وغرب المحيط الهادي .
- تحدث معظم الإصابات خلال فصول السنة الدافئة.
- تتركز الإصابات في المناطق الريفية وحول مزارع الأرز.
- يصيب التهاب الدماغ الياباني عادة الأطفال إلا أنه قد يصيب البالغين أيضًا .
- يعتبر ظهور الأعراض شيئًا نادرًا وفي حال حدوثها فإن معدلات الوفاة قد تصل إلى ٣٠٪ والإعاقات العصبية قد تحدث في ٣٠-٥٠٪ من الحالات.
- يكتسب البالغون في المناطق التي يستوطن فيها المرض مناعة طبيعية من الفيروس وذلك نتيجة لإصابتهم به أثناء الطفولة.

المرض

- معظم الإصابات تكون بدون أعراض أو ذات أعراض طفيفة مثل الحمى والصداع.
- في حوالي ١ من كل ٢٥٠ حالة قد تكون الإصابة وخيمة، وتشمل الأعراض :
 - ارتفاع درجة الحرارة
 - الصداع
 - آلام في الرقبة
 - تشوش ذهني
 - غيبوبة
 - تشنجات
 - شلل

العلاج

- لا يوجد علاج محدد للمرض ، وإنما يتم علاج الأعراض فقط

اللقاحات

- يوجد لقاح فعال لمرض التهاب الدماغ الياباني ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق زمني (٤) أسابيع.
- ويمكن إعطاؤه ابتداءً من عمر شهرين.
- يتوفر لقاح التهاب الدماغ الياباني في عيادة السفر بمركز الأمراض الإنتقالية.

التوصيات للمسافرين

- يعتبر تفادي لدغات البعوض خاصة بعد الغروب الوسيلة الرئيسية والأكثر فعالية لمنع الإصابة بالمرض وذلك باستخدام المراهم، الملابس الواقية وشبكات البعوض أثناء النوم .
- ينصح المسافرون إلى المناطق التي يستوطن فيها المرض بأخذ اللقاح وخاصة الذين ينوون البقاء لمدة أكثر من شهر أو زيارة مناطق ريفية .
- عند التعرض للدغات البعوض :
 - يجب عدم حك موقع اللدغة .
 - استخدام بعض المواد المراهم التي قد تخفف من الحكة.