

التهاب الدماغ الناتج عن لدغ القراد



للمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال على :

مركز الأمراض الإنتقالية

مؤسسة حمد الطبية

CDCtravel@hamad.qa @

٤٠٢٥٤٠٠٣ ☎

تمت الموافقة عليه من قبل:

تثقيف المرضى وأسرهم

patienteducation@hamad.qa @

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

عضو في مؤسسة حمد الطبية
A Member of Hamad Medical Corporation



التهاب الدماغ الناتج عن لدغ القرادات

مقدمة

- ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق لدغ القرّادات
- قد ينتقل عن طريق تناول منتجات الألبان غير المبسترة.
- معظم الحالات يتم الإصابة بها أثناء القيام بالأنشطة الخارجية مثل :
 - العمل
 - التخيم
 - تسلق الجبال أثناء موسم تكاثر القرّادات (من الربيع حتى بداية الخريف).
- يستوطن المرض في مناطق شمال ووسط وشرق أوروبا ، شمال الصين، منغوليا وروسيا.

المرض

- يسبب المرض حدوث إلتهاب في السحايا (الأغشية المحيطة بالجهاز العصبي) والدماغ.
- تمتد فترة الحضانة ما بين ٢-٢٨ يوم.
- تتمثل الأعراض بداية بأعراض مشابهة للإنفلونزا، يعقبها حمى وصداع وأعراض التهاب الدماغ.

العلاج

- لا يوجد علاج للمرض.

اللقاحات

- يجب على المسافرين إلى المناطق التي يستوطن فيها المرض الحرص على أخذ اللقاح خاصة إذا كانت زيارتهم تشمل العديد من الأنشطة الخارجية مثل التخيم.
- يعطى اللقاح على ٣ جرعات بالحقن العضلي حسب الجدول التالي :
 ١. الجرعة الأولى .
 ٢. الجرعة الثانية بعد (١-٣) أشهر من الجرعة الأولى.
 ٣. الجرعة الثالثة بعد (٥-١٢) شهر من الجرعة الثانية.
 ٤. يعقبها جرعة منشطة كل (٣-٥) سنوات إذا إقتضت الحاجة .

توصيات للمسافرين

- يجب على المسافرين إلى المناطق التي يستوطن فيها المرض:
 - الدراية بالمرض (أعراضه وطرق إنتقاله)
 - الدراية بالأنشطة التي قد تزيد التعرض للدغ القرّادات مثل المشي و التخيم في مناطق الغابات وخاصة في موسم تكاثر القرّادات.
 - الحرص على تجنب لدغات القرّادات وإزالتها سريعاً في حالة التعرض لها .
 - إستخدام الملابس الواقية ذات الأكمام الطويلة والبناتيل وإستخدام المراهم المضادة للدغ القرّادات.
 - تجنب منتجات الألبان غير المبسترة .
 - يتوفر اللقاح في عيادة السفر بمركز الأمراض الإنتقالية