

داء المشعرات

إذا كنت مصاباً بداء المشعرات ، فماذا يعني ذلك لشريكك؟

- قد يكون شريكك مصاباً بداء المشعرات أيضاً .
- تأكد من إخبار شريك حياتك (زوجك) بإصابتك، حتى يتم اختباره وعلاجه.
- تجنب ممارسة الجنس حتى ينتهي كلاكما من العلاج.

كيف يتم علاج داء المشعرات؟

- يمكن علاج داء المشعرات و الشفاء منه بالمضادات الحيوية.
- يجب الالتزام التام بتناول جميع الأدوية للمدة المحددة من قبل الطبيب للتأكد من شفاءك.
- لا تشارك دواءك مع أي شخص آخر. أنت بحاجة إلى كمية كاملة من الدواء.
- إذا استمرت الأعراض بعد العلاج ، فعليك مراجعة طبيبك.

احم نفسك وشريكك:

- راجع الطبيب دائماً إذا كان شريكك يعالج من داء المشعرات أو إذا لاحظت أنت أو شريكك أي أعراض.
- إذا كنت مصاباً بمرض داء المشعرات ، فيجب أن تخضع لفحص الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
- تأكد من إخبار شريكك بإصابتك، حتى يتمكن من الخضوع للفحص والعلاج.
- تحدث بصراحة وصدق مع شريكك عن داء المشعرات والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
- لا تحتاج إلى إخبار شريك حياتك بشكل مباشر إذا كنت لا تشعر بالراحة لذلك.
- ومع ذلك يتطلب منك توفير تفاصيل الاتصال الدقيقة لك ولشريكك، وربما يستتج شريكك بشكل غير مباشر أن تحويله قد تم من قبلك.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على الرقم (٤٠٢٥٤٠٢٥) الخاص
بعيادة العدوى المنقولة جنسيا في مركز الأمراض الإنتقالية.

تثقيف المرضى وأسرهم
patienteducation@hamad.qa @



الحقائق:

- داء المشعرات، هو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
- يمكن أن يصاب به الرجال والنساء.
- كثير من الأشخاص المصابين بداء المشعرات لا يعرفون ذلك. غالباً لا توجد أعراض للعدوى.
- النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالأعراض.
- ممكن للمصاب أن ينقل داء المشعرات للآخرين دون معرفة ذلك.
- داء المشعرات يسهل علاجه والشفاء منه.

كيف يمكنني تقليل مخاطر إصابتي بداء المشعرات؟

- يجب عدم ممارسة الجنس خارج إطار العلاقات الزوجية لتجنب خطر الإصابة بداء المشعرات.
- يمكن للواقي الذكري أن يقلل من خطر الإصابة بداء المشعرات إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة.
- توقف عن ممارسة الجنس واستشر الطبيب فوراً في الحالات التالية:
- إذا لاحظت أي إفرازات غير طبيعية.
- الشعور بالحرقان عند التبول.

- غسل الأعضاء التناسلية أو التبول أو الاستحمام بعد ممارسة الجنس لا يمنع أي مرض منقول جنسياً.

كيف يصاب شخص ما بداء المشعرات؟

- يمكن أن تصابي بداء المشعرات عن طريق ممارسة الجنس المهبل مع شخص مصاب.
- عادة ما تصاب النساء بالعدوى في المهبل.
- عادة ما يصاب الرجال بالعدوى في مجرى البول (قناة البول).

ما هي أعراض داء المشعرات؟

- كثير من المصابين بداء المشعرات لا يعرفون بإصابتهم لعدم ظهور أعراض عليهم.

عند النساء:

- قد تلاحظين هذه الأعراض:
- خروج إفرازات غير عادية من المهبل برائحة كريهة قوية.
- عدم الراحة عند التبول وعند ممارسة الجنس.
- تهيج أو حكة حول الأعضاء التناسلية.

عند الرجال:

- لا تظهر أي أعراض لدى معظم الرجال المصابين بداء المشعرات ، ولكن قد تلاحظ هذه الأعراض:
- شعور بالتهيج أو الحرقه داخل العضو الذكري.
- خروج إفرازات من العضو الذكري.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مصاباً بداء المشعرات؟

- عن طريق الفحص السريري من قبل طبيبك والفحص المخبري لعينات من عنق الرحم للنساء أو البول للرجال بحثاً عن الطفيليات المسببة للمرض.
- يصعب تشخيص المرض عند الرجال مقارنة بالنساء.

متى يجب ان اخضع لتلك الفحوصات؟

بالنسبة للنساء:

- إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه .
- إذا كان شريكك مصاب بداء المشعرات أو أي أعراض متعلقة به.

بالنسبة للرجال:

- إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- إذا كان شريكك مصاب بداء المشعرات أو أي أعراض متعلقة به.

هل يمكن أن أصاب بداء المشعرات مرة أخرى بعد العلاج والشفاء منه؟

نعم ، يمكن أن تصاب بداء المشعرات مرة أخرى. حيث يمكنك الإصابة بالعدوى من شريك مصاب ولم يخضع للعلاج أو من شريك جديد.

ماذا يحدث إذا لم أخضع للعلاج ؟

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز – HIV) إذا مارست الجنس مع شريك مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة. كما أن فرصة نقل عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز – HIV) إلى شريكك تكون أكبر إذا كنت أنت مصاباً به.

بالنسبة للنساء:

- عند النساء الحوامل، فمن المرجح حدوث الولادة المبكرة، ويمكن ولادة طفل قليل الوزن.

بالنسبة للرجال:

- داء المشعرات يمكن أن يسبب التهابات في مجرى البول أو غدة البروستاتا.
- قد لا تختفي الأعراض.
- يمكنك نقل عدوى داء المشعرات إلى شريكك، أو إصابته به مرة أخرى إذا كان قد تعافى منه.