

ارتفاع سكر الدم اللاكتونوني



٨. ما هي مضاعفات إرتفاع سكر الدم اللاكتونوني؟
١. فقدان الوعي و الغيبوبة.
 ٢. الجلطة الدماغية.
 ٣. تشنجات عضلية.
 ٤. الوفاة.

٥. ما هي طريقة الكشف عن ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟
 ١. فحص نسبة السكر في الدم . (عادة يكون أكثر من ٦٠٠ ملغم/دلترا).
 ٢. فحص نسبة الكيتون في البول. (عادة يكون نسبة الكيتون قليلة جداً أو غير موجود).
٦. كيف يمكن الوقاية من حدوث ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟
 ١. معرفة أعراض و علامات ارتفاع سكر الدم .
 ٢. فحص السكر باستمرار خاصة في أيام المرض .
 ٣. اتباع خطة علاجية مناسبة لعلاج مرض السكري .
 ٤. اتباع نظام غذائي مناسب لتجنب ارتفاع سكر الدم .
 ٥. شرب كميات كافية من الماء .
 ٦. أخذ جرعات الإنسولين أو الحبوب بالوقت والكمية الموصوفة من قبل الطبيب بالشكل الطبيعي ويرجى عدم إيقاف أخذ الإنسولين.
٧. ما علاج ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟

هذه الحالة تعتبر خطره وجادة تحتاج إلى تلقي الرعاية الصحية والعلاجية داخل المستشفى، إذا شعرت بأي من أعراض سكر الدم اللاكيتوني توجه إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج. وهذه الحالة تحتاج إلى عدة أيام أو أسابيع لحدوثها.
١. ما هو ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟

هي إحدى مضاعفات مرض السكري الحادة التي تتميز بارتفاع سكر الدم إلى ما يزيد عن ٦٠٠ ملغم/دلترا دون حدوث زيادة في حموضة الدم . يحدث ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني عند المرضى المصابين بمرض السكري النوع الأول و الثاني، ولكن غالباً ما يحدث في النوع الثاني
٢. كيف يحدث ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟
 ١. ارتفاع مستوى السكر في الدم
 ٢. ظهور وخروج السكر في البول من خلال الكلية
 ٣. كثرة التبول
 ٤. جفاف وارتفاع سكر الدم اللاكيتوني
٣. ما أسباب ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟
 ١. ارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم.
 ٢. حدوث التهاب بالجسم أو العدوى الشديدة.
 ٣. إختلال في عمل وظائف الكلية.
 ٤. تناول أدوية معينة مثل الستيرويدات أو الكورتيزون أو الأدوية التي تزيد من إدرار البول
 ٥. الإكثار من شرب الكحول.
٤. ما هي أعراض و علامات ارتفاع سكر الدم اللاكيتوني؟
 ١. هذيان وعدم تركيز
 ٢. ارتفاع السكر في الدم إلى ما يزيد عن ٦٠٠ مغ/دلترا
 ٣. التعب و الإعياء
 ٤. العطش الشديد
 ٥. كثرة التبول
 ٦. ارتفاع درجة الحرارة
 ٧. جفاف الفم.