



HC No.															
Patient Name															
Nationality															
Date of Birth	D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y					
Age in years			Gender M/F												

Apixaban Schedule

Schedule Information
Surgery name or type
Bleeding risk with procedure
Thromboembolic risk
Kidney Function

Date DD/MM/YY	Days to Surgery	Apixaban Dose, Frequency	Comments /Instructions
	3 Days before SurgeryAMPM If CrCl < 30 ml/min or very high bleeding risk procedure should be on hold for 3 days	
	2 Days before SurgeryX.....AMX.....PM	
	1 Day before SurgeryX.....AMX.....PM	
	Day of SurgeryX.....AMX.....PM	Discuss with your physician if you can resume your medication the next day.
	1 Day After SurgeryX.....AMPM	When hemostasis is achieved
	2 Days after SurgeryX.....AMX.....PM	
	3 Days after SurgeryX.....AMX.....PM	

HC No.																				
Patient Name																				
Nationality																				
Date of Birth	D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y										
Age in years				Gender M/F																

جدول بيكسابان

معلومات ريفاروكسابان
الجراحة (اكتب الجراحة التي سيخضع لها المريض)
خطر النزيف مع الجراحة
Thromboembolic risk
(Kidney Function (CrCl

تاريخ يوم/شهر/سنة	ايام للجراحة	أبيكسابان الجرعة، عدد المرات	تعليقات أو الإرشادات
	٣ أيام قبل الجراحة ، صباحاً ، مساءً	
	يومين قبل الجراحة ، صباحاً ، مساءً	
	يوم قبل الجراحة	X..... ، صباحاً X..... ، مساءً	
	يوم الجراحة	X..... ، صباحاً X..... ، مساءً	تناقش مع الطبيب إذا كنت تستطيع أخذ الدواء في اليوم التالي.
	يوم بعد الجراحة	X..... ، صباحاً ، مساءً	
	يومين بعد الجراحة ، صباحاً ، مساءً	
	٣ أيام بعد الجراحة ، صباحاً ، مساءً	