



Bridging with Warfarin

HC No.																			
Patient Name																			
Nationality																			
Date of Birth	D		D		/		M		M		/		Y		Y		Y		Y
Age in years																			
Gender M/F																			
Weight of Patient																			

Schedule Information
Surgery Name or Type
Bleeding risk with procedure
Thromboembolic risk
Kidney Function (CrCl)

Date DD/MM/YY	Days before Surgery	Warfarin Dose(mg)	LMWH (name, dose, frequency)	Comments or instructions
	6 Days before Surgery	Take usual dose		
	5 Days before Surgery	Stop warfarin No Dose this Day		
	4 Day before Surgery	No dose		
	3 Day After Surgery	No dose		
	2 Days after Surgery	No dose		
	1 Days after Surgery	No dose		Check INR and discuss the need for injections
	Day of Surgery/ Procedure			Discuss with your physician about resuming warfarin and need for injections
	1 Day after surgery			
	2 Days after surgery			
	3 Days after surgery			
	4 Days after surgery			
	5 Days after surgery			

Instructions for the prescriber:

- Need to check INR before surgery and according to the result the doctor will decide whether to bridge with LMWH
- LMWH need to be discontinued within 24 hours before the planned surgery or procedure based on kidney function
- If the patient resumed oral intake then warfarin can be restarted in the evening (can be restarted 12-24 hr after surgery)
- LMWH can be resumed on day 1 post surgery when hemostasis is secured (no earlier than 12 hrs post-op)
- Stop LMWH when INR is therapeutic



HC No.																					
Patient Name																					
Nationality																					
Date of Birth	D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y											
Age in years																					Gender M/F
Weight of Patient																					

جدول الوارفارين

معلومات أساسية
اسم العملية الجراحية
احتمالية النزيف من العملية الجراحية
خطر الجلطات الدموية
وظائف الكلى (CrCl)

تاريخ يوم/شهر/سنة	أيام قبل الجراحة	جرعة الوارفارين (كغ)	إبرة السيولة، عدد المرات	تعليقات أو الإرشادات
	٦ أيام قبل الجراحة	تناول جرعتك المعتادة		
	٥ أيام قبل الجراحة	أوقف الوارفارين لا جرعة		
	٤ أيام قبل الجراحة	لا جرعة		
	٣ أيام قبل الجراحة	لا جرعة		
	يومين قبل الجراحة	لا جرعة		
	يوم قبل الجراحة	لا جرعة		افحص نسبة السيولة
	يوم العملية/إجراء			تناقش مع الطبيب عن إعادة تناول الوارفارين
	يوم بعد الجراحة			
	يومين بعد الجراحة			
	٣ أيام بعد الجراحة			
	٤ أيام بعد الجراحة			
	٥ أيام بعد الجراحة			

تعليمات للطبيب:

- يجب فحص نسبة سيولة الدم قبل العملية الجراحية، ثم يقرر الطبيب بناءً على نتيجة الفحص إذا كان المريض بحاجة إلى جرعة من دواء LMWH المضاد للتخثر.
- يجب إيقاف جرعات الـ LMWH قبل ٢٤ ساعة من العملية الجراحية المقرر إجراؤها، وذلك بناءً على مستوى وظائف الكلى.
- إذا بدأ المريض شرب السوائل عن طريق الفم مجدداً بعد الجراحة، فيمكن حينها استئناف استخدام الوارفارين في مساء نفس اليوم (يمكن بدء تناول الوارفارين بعد ١٢ إلى ٢٤ ساعة من العملية الجراحية).
- يمكن استئناف استخدام دواء LMWH في اليوم الأول بعد الجراحة (ليس قبل ١٢ ساعة على الأقل بعد العملية) وذلك بعد التأكد من مستوى الإرقاء (وقف نزف الدم).
- يجب إيقاف جرعات الـ LMWH إذا وصلت نسبة سيولة الدم للمستوى الطبيعي.