	v	
	1	

الاسم : العمر:

التاريخ:

ن ت	ن ب	
	_	

خطة عمل لمواجهة نوبات الربو عند طفلك

توضح خطة العمل التالية الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث نوبة الربو: وكجزء من هذه الخطة ينبغي على طفلك أن يعرف كيف يميز العلامات التحذيرية المبكرة لحدوث نوبة ربو؟ وماذا يفعل؟ وما الأدوية التي يجب تناولها؟

> للوقاية من أعراض الربو يومياً يستخدم هذا العلاج عند تحقق جميع الشروط التالية:

تناول يومياً العلاج الوقائي و السيطرة على الربو

عدد المرات (متى)	الجرعة (الكمية)	الأدوية

لا يوجد كحة (سعال). لايوجد أزيز في الصدر أو ضيق في الصدر لا يوجد قصر في النفس يستطيع العمل واللعب

سرعة تدفق هواء الزفير أعلى من ٪٨٠

اتبع هذه الخطة في حال ظهور واحد من الأعراض التالية:

سعال، صفير أثناء التنفس وضيق في الصدر

قصر/ضيق النفس

الاستيقاظ من النوم ليلاً بسبب نوبة الربو

عدم القدرة على القيام بنشاطه اليومي المعتاد

سرعة تدفق هواء الزفير بين (٪٢٠ – ٪٨٠)

انتبه وتصرف بهدوء

الإستمرار بأخذ العلاج الوقائي طويل الأمد الذي تتناوله يوميا

عدد المرات (متى)	الجرعة (الكمية)	الإجراء
كل :	تناول بختين من البخاخ أو	 تناول دواء الربو سريع التأثير البخاخ
کل :	٢,٥ ملغ +٢ ملل من الماء الملحي الطبيعي	أو الرذاذ

٢. ابتعد عن مسببات الربو:

وبر الحيوانات، العث المنزلي والغبار، دخان السجائر و التبغ بأنواعه، الروائح القوية والأبخرة والبخاخات (السبراي)، غبار الطلع، العفن وغبار الطباشير، تغير حرارة الجو،

بقيت الأعراض المذكورة (في الجزء السابق) على حالها او اشتدت بعد مرور ٢٤ ساعة

اتبع هذه الخطة في حال ظهور الأعراض التالية:

صعوبة في التنفس وسرعته عدم القدرة على التكلم

لا يستطيع المشي

سرعة تدفق هواء الزفير أقل من ٪٦٠

حالة طبية طارئة - اطلب المساعدة فوراً

تناول يومياً العلاج الوقائي طويل الأمد

عدد المرات (متى)	الجرعة (الكمية)	الإجراء
کل: کل:	تناول البخاخ (٤-٦) بخات أو ٢٠٥٥ ملغم +٢ ملل الماء الملحي العادي	تناول الأدوية سريعة التأثير (الرذاذ)
	أقرب مستشفى الآن	ا اتصل بطبيبك أو اذهب إلى

مفكرة مريض الربو

		3.3 0 23 3
السبب	التاريخ	تناولت الأدوية سريعة التأثير

التاريخ تناولت الأدوية سريعة التأثير

> للاستفسار و الاستعلام يرجى الاتصال بالأرقام التالية: عيادة الأطفال هاتف رقم: 1495 / 4439 1494 / 4439 3346 3164